

# ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС

**ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ:** ПОСЛЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА

ЧЕРЕЗ 2-10 ДНЕЙ.

**ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:** ЖЖЕНИЕ, БОЛЬ, ПОКРАСНЕНИЕ,  
ВОДЯНИСТЫЕ ПУЗЫРЬКИ В ОБЛАСТИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.

# ХЛАМИДИОЗ

**ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ:** ПОСЛЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА ЧЕРЕЗ 7-21 ДЕНЬ.

**ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:** ЖЖЕНИЕ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ, ВОДЯНИСТЫЕ  
БЕЛОВАТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ У ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН  
ИЛИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У МУЖЧИН. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ.

# ТРИХОМОНИАЗ

**ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ:** ПОСЛЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА ЧЕРЕЗ 5-10 ДНЕЙ.

**ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:** У ЖЕНЩИН УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЕНИЙ,  
ВОДЯНИСТЫЕ, ПЕНИСТЫЕ ИЛИ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА ВЫДЕЛЕНИЯ И ЗАПАХ  
ТУХЛОЙ РЫБЫ ИЗ ВЛАГАЛИЩА, БОЛЕЗНЕННОСТЬ, ВОСПАЛЕНИЕ И ЗУД ВО  
ВЛАГАЛИЩЕ, БОЛЬ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ. У МУЖЧИН ВОДЯНИСТЫЕ  
БЕЛОВАТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ПЯТНА НА БЕЛЬЕ, БОЛЬ И ЧУВСТВО ЖЖЕНИЯ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ.  
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ  
БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ.



# ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ и ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

## ВИЧ И СПИД – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

**ВИЧ** – ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА. ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
ВЫЗЫВАЕМОЕ ЭТИМ ВИРУСОМ, НАЗЫВАЕТСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. ЛЮДИ,  
В КРОВИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ВИЧ, НАЗЫВАЮТСЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ.

**СПИД** – СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУННОГО ДЕФИЦИТА.  
СПИД – ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. С МОМЕНТА ЗАРАЖЕНИЯ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ДО РАЗВИТИЯ СПИДА МОЖЕТ ПРОЙТИ ДО 15 ЛЕТ.  
ПОКА ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ НЕ ПЕРЕШЛА В СТАДИЮ СПИДА,

ИНФИЦИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ,  
ВЫГЛЯДЕТЬ ЗДОРОВЫМ И ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАТЬ О ТОМ,  
ЧТО У НЕГО В КРОВИ ЕСТЬ ВИРУС.

## КАК МОЖНО УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА В КРОВИ ВИЧ?

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ УЗНАТЬ ЭТО –  
СДАТЬ КРОВЬ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВИЧ.

## ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ?

ТЕСТ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АНТИТЕЛ К ВИЧ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА.  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗНАЧИТ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ОБНАРУЖЕНЫ АНТИТЕЛА К ВИЧ.  
ЭТО ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВИЧ-ИНФИЦИРОВАН  
И МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ ВИРУС ДРУГИМ ЛЮДЯМ.  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗНАЧИТ, ЧТО АНТИТЕЛА К ВИЧ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.

ЕСТЬ СИТУАЦИИ, КОГДА ТЕСТ МОЖЕТ ДАТЬ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЖЕН ВИЧ;
- ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕН ВИЧ, НО ОРГАНИЗМ  
ЕЩЕ НЕ ВЫРАБОТАЛ АНТИТЕЛА К ВИРУСУ  
(«ПЕРИОД ОКНА»);
- ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАЗВИЛСЯ СПИД,  
КОГДА ИММУННАЯ СИСТЕМА УЖЕ НЕ  
РАБОТАЕТ (В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЧЕЛОВЕК  
ТЯЖЕЛО БОЛЕН)



# КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ)?

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО:

- ПРИ СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ БЕЗ ПРЕЗЕРВТИВА, КОГДА В ОРГАНИЗМ ПОПАДАЮТ СПЕРМА, ВАГИНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ ИЛИ КРОВЬ;
- ПРИ ПРЯМОМ ПОПАДАНИИ КРОВИ В ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ РАНКИ, ЯЗВОЧКИ, СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ, ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ (ЗДОРОВАЯ КОЖА – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВИЧ);
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ШПРИЦЕВ И ИГЛ;
- ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ.

## ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ:

ПОЦЕЛУЯХ, РУКОПОЖАТИИ, ОБЪЯТИЯХ,  
ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ ПОСУДОЙ,  
ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,  
ПОЛЬЗОВАНИИ БАССЕЙНОМ, СПОРТЗАЛОМ.

## ГДЕ МОЖНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ?

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д.53-А, КАБИНЕТ №11,  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 8.00 ДО 18.00.  
ТЕЛЕФОН 8(4242) 72-21-09, 72-62-28, CENTER@HIV65.RU,  
[WWW.HIV65.RU](http://WWW.HIV65.RU)

СОГЛАСНО ЗАКОНУ ДО И ПОСЛЕ ТЕСТА С ВАМИ ДОЛЖЕН ПОГОВОРИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ОБЯЗАТЬ СЛ�ДОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА И ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО! ТЕСТИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОЙТИ И АНОНИМНО.

# ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРИЗНАКИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НЕ ВСТУПАЙ В СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИСЬ К ВРАЧУ!

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ И НАЗНАЧЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЧИСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ПРИНЦИПУ «ПОМОГЛО ДРУГОМУ - ПОМОЖЕТ И МНЕ!»

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВТИВОМ ПОМНИ:

- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙ СРОК ГОДНОСТИ ПРЕЗЕРВТИВА!
- ИСПОЛЬЗУЙ ПРЕЗЕРВТИВ ОДИН РАЗ!
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ДВА ПРЕЗЕРВТИВА, НАДЕТЫЕ ОДИН НА ДРУГОЙ:  
ПРИ ТРЕНИИ ОНИ МОГУТ ПОРВАТЬСЯ!

## СИФИЛИС

### ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ:

ПОСЛЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА ЧЕРЕЗ 3-4 НЕДЕЛИ.

**ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:** ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗВОЧКИ В МЕСТЕ СЕКСУАЛЬНОГО КОНТАКТА, УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ В МЕСТЕ КОНТАКТА. ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ПРИЗНАКИ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЫПЬ НА ТЕЛЕ, ЯЗВЫ ВО РТУ, ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА, ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС, ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ, ЛЕГКИХ, ПОЧЕК, МОЗГА.

## ГОНОРЕЯ

**ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ:** ПОСЛЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА ЧЕРЕЗ 2-7 ДНЕЙ.

**ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:** ЖЖЕНИЕ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ, ГНОЙНЫЕ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН ИЛИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У МУЖЧИН.